



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

**RAPORT privind**  
**STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL**  
**BRAȘOV**  
**pentru luna decembrie 2021**

**1. Caracterizarea factorilor de mediu**

**1.1. Factor de mediu AER**

La nivelul A.P.M. Brașov, supravegherea calității aerului se realizează prin următoarele rețele:

a). Rețeaua manuală

În rețeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac, hidrogen sulfurat și analiza unor parametrii ai apelor de precipitații.

Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală prevăzute STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate” sunt indicate tabelul următor.

Tabelul 1.1.1: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de determinare
1	Amoniac	spectrofometrie	STAS 10812-76
2	Hidrogen sulfurat	spectrofometrie	STAS 10814-76
3	Analiza unor parametrii ai apelor de precipitații	potențiometrie pentru pH	SR EN ISO 10523:2012 Ghid Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995
		volumetrie pentru alcalinitatea probelor cu pH>5	
		spectrofometrie pentru NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	
		volumetrie pentru Cl <sup>-</sup>	

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de 0,3 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea medie de scurtă durată de amoniac și 0,0150 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea medie de scurtă durată de hidrogen sulfurat.

b). Rețeaua automată.


Calitatea aerului în aglomerarea Brașov este monitorizată prin măsurători continue în 6 stații automate amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație:

- **Stație de trafic: stația BV1 – B-dul Calea București, Brașov** – amplasată în zonă cu trafic intens;
- **Stație de trafic: stația BV3 – B-dul Gării** – amplasată în zonă cu trafic intens;

- Stație de fond urban: stația BV2 – str. Memorandului, Brașov** – amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din aglomerarea Brașov;
- Stație industrială: stația BV5 – B-dul Al. Vlahuță, Brașov** – al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Brașov;
- Stație de fond suburban: stația BV4 – comuna Sânpetru** – având ca obiectiv evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării.
- Stație de fond urban: stația BV6 – str. 9 Mai, Codlea** - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din județul Brașov;
- Stație de tip EMEP: EM-1 – comuna Fundata** – monitorizează și evaluatează poluarea aerului în context transfrontier la lungă distanță.

În legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Brașov în limitele administrative ale municipiului Brașov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populație al cărei număr depășește 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării și gestionării aerului înconjurător.

### Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Brașov



#### Legendă:

- Stația de trafic BV-1; adresa Brașov, Calea București / Str. Soarelui  
 Stația de fond urban BV-2; adresa: Brașov, Str. Memorandului, fn  
 Stația de trafic BV-3; adresa: Brașov, B-dul Gării / Str. Lăcrămioarelor  
 Stația de fond suburban BV-4; adresa: Sânpetru, Str. Mori, fn  
 Stația industrială BV-5; adresa: Brașov , B-dul Al. Vlahuță/Parcul Mic  
 Stația de fond urban BV-6; adresa: Codlea, Str. 9 Mai, nr.10  
 Stația EMEP EM-1; adresa: Fundata

Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în legislația română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 (actualizată) având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

În stațiile de monitorizare din aglomerarea Brașov, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurări continue pentru: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NOx}$ ), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10) automat (prin nefelometrie ortogonală), ozon ( $\text{O}_3$ ) și precursorsi organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen,

o-xilen, m-xilen și p-xilen). Corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitatea radiației solare.

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011, sau metode echivalente pentru care se determină factorul de echivalentă. În tabelul 1.1.1 sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Tabelul 1.1.2: Metode de referință pentru monitorizarea poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
1	Dioxidul de sulf	metoda fluorescenței în ultraviolet	SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet
2	Oxizi de azot	metoda prin chemiluminiscență	SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de azot și oxizi de azot prin chemiluminiscență
3	Monoxid de carbon	metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv	SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv
4	Ozon	metoda fotometrică în ultraviolet	SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet
5	Pulberi în suspensie PM 10 și PM2,5	metoda gravimetrică	SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie
6	Benzen	gaz chromatografie	SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de benzen

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Tabelul 1.1.3. Obiective de calitate a aerului ambiental

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
1	Dioxid de sulf	Prag de alertă	<b>500 µg/m<sup>3</sup></b> – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	<b>350 µg/m<sup>3</sup></b> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>125 µg/m<sup>3</sup></b> – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>20 µg/m<sup>3</sup></b> – valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendaristic și iarna 1 martie – 31 martie)
2	Oxizi de azot	Prag de alertă	<b>400 µg/m<sup>3</sup></b> – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	<b>200 µg/m<sup>3</sup> NO<sub>2</sub></b> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>40 µg/m<sup>3</sup> NO<sub>2</sub></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane <b>30 µg/m<sup>3</sup> NO<sub>x</sub></b> – valoarea limită anuală pentru protecția vegetației
3	Ozon	Prag de alertă	<b>240 µg/m<sup>3</sup></b> – media pe 1 oră
		Valori țintă	<b>120 µg/m<sup>3</sup></b> – valoare țintă pentru protecția sănătății umane <b>18.000 µg/m<sup>3</sup> x h</b> – valoare țintă pentru protecția vegetației
		Obiectiv pe termen lung	<b>120 µg/m<sup>3</sup></b> – obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane <b>6000 µg/m<sup>3</sup> x h</b> – obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației

Nr. crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului		
4	PM 10	Valori limită	<b>50 µg/m<sup>3</sup></b> PM 10 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>40 µg/m<sup>3</sup></b> PM10 – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane	
5	PM 2,5	Valoare limită	<b>25 µg/m<sup>3</sup></b> – valoare limită pentru media anuală (1 ianuarie 2015)	
6	Monoxid de carbon	Valoare limită	<b>10 mg/m<sup>3</sup></b> – valoare limită pentru protecția sănătății umane	
7	Benzen	Valoare limită	<b>5 µg/m<sup>3</sup></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane	

### 1.1.1. Rețeaua manuală

#### 1.1.1.1. Amoniacul

În luna decembrie 2021 nu au fost prelevate probe de amoniac.

#### 1.1.1.2. Hidrogenul sulfurat

În luna decembrie 2021 nu au fost prelevate probe de hidrogen sulfurat.

#### 1.1.1.3. Analiza unor parametrii ai apelor de precipitații

Parametrii fizico-chimici analizați din probele de precipitații prelevate în luna **decembrie** 2021 dintr-un punct de prelevare amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov) includ pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu pH>5, amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) și cloră ( $\text{Cl}^-$ ).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnică în zilele lucrătoare și cel mult la un interval de 4 zile, în zilele nelucrătoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip pâlnie/vas colector din sticlă.

Pentru analiza parametrilor probele de precipitații prelevate au fost prelucrate în laborator pentru a se determina pH-ul prin potențiometrie, alcalinitatea pentru probele cu pH>5 prin volumetrie, concentrația ionului amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) prin spectrofotometrie UV/VIS și concentrația ionului clorură ( $\text{Cl}^-$ ) prin volumetrie.

Metodele folosite pentru prelevarea și măsurarea pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații sunt cele prezентate în Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, respectiv în SR EN ISO 10523:2012 și Ghidul Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995.

Rezultatele obținute din analiza parametrilor pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații din municipiul Brașov în luna **decembrie** 2021 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 1.1.1.3.1. Rezultatele obținute din analiza parametrilor din probele de precipitații din luna decembrie

Nr. crt.	Perioada de prelevare	Ora prelevării	Parametru determinat	Metoda de încercare	Volum de precipitații prelevat, (L)	Rezultatul măsurării (u.m.)
1	03.12.2021 - 06.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,025	6,4 upH
2	06.12.2021 - 07.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,060	6,93 upH
			[ $\text{H}^+$ ]	volumetrie		88,9 $\mu\text{e/L}$
3	07.12.2021 - 08.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,450	5,81 upH
			[ $\text{H}^+$ ]	volumetrie		160 $\mu\text{e/L}$
			[ $\text{NH}_4^+$ ]	spectrofotometrie UV/VIS		36 $\mu\text{e/L}$
			[ $\text{Cl}^-$ ]	volumetrie		48 $\mu\text{e/L}$

4	10.12.2021 - 13.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,417	5,79 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		160 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		36 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		64 µe/L
5	13.12.2021 - 14.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,108	5,3 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		360 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		66,4 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		48 µe/L
6	14.12.2021 - 15.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,010	5,46 upH
7	15.12.2021 - 16.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,010	5,33 upH
8	16.12.2021 - 17.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,170	5,59 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		280 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		40 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		40 µe/L
9	17.12.2021 - 20.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,115	5,14 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		40 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		81,5 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		48 µe/L
10	20.12.2021 - 21.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,050	5,58 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		360 µe/L
11	24.12.2021 - 27.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,120	5,33 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		360 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		51,2 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		260 µe/L
12	27.12.2021 - 28.12.2021	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,023	5,26 upH

În mod obișnuit pH-ul precipitațiilor este ușor acid datorită prezenței acizilor slabii, pH-ul precipitațiilor fiind considerat neutru la valori cuprinse în intervalul de pH:5.....6 upH. Astfel se poate afirma că probele de precipitații prelevate în luna decembrie au avut pH neutru, cu excepția a 2 probe care au avut pH peste 6 upH, cauzat de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabii, în probele prelevate.

Întocmit: Mihaela Marean

### 1.1.2. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în aglomerarea Brașov

Datele transmise de analizoare și senzorii meteo au fost achiziționate continuu ca medii pe minut în cele cinci stații de monitorizare. Aceste valori singulare reprezintă înregistrările ale concentrațiilor poluanților, care nu oferă informații despre apariția poluanților, variațiile din timpul anului sau despre intensitatea sau durata unui episod cu concentrații mari sau mici de poluant.

Pentru a interpreta și compara datele achiziționate, valorile medii pe minut au fost procesate în medii orare. Media orară, influențată de vârfurile atipice de concentrație de scurtă durată permite identificarea unor cicluri anuale în funcție de ciclul de funcționare a surselor de emisie și variația condițiilor meteorologice de dispersie. Pentru a atenua variațiile întâmplătoare și a identifica variațiile în timp valorile orare au fost mediate pe diferite perioade: medii mobile pe 8 ore, medii zilnice, sau medii lunare. Pentru anumiți poluanți, cum ar fi poluanții proveniți din trafic și ozonul, care prezintă o variație zilnică sistematică, s-a calculat media fiecărei ore din zi din mediile orare disponibile pentru luna **decembrie 2021** și s-a prezentat ciclul zilnic.

Rezultatele obținute pentru poluanții normați sunt prezentate în paragrafele următoare, ca medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice și lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore și sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 1.1.2.

Setul de date validate disponibile conține un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru parametrii monitorizați. Perioadele cu date lipsă sunt inerente în orice program de măsurare pentru monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput și operat. Acestea au fost generate de programul de calibrare și menenanță planificată, variații sau perturbări în funcționarea echipamentelor din stațiile de monitorizare, dar și de funcționări defectuoase ale echipamentelor de măsurare și prelevare.

### 1.1.2.1. Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale (erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei) și surse antropice (sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale – siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric, industria celulozei și hârtiei – și din emisiile provenite de la motoarele diesel în mai mică proporție).

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca afecțiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

Dioxidul de sulf contribuie la acidificarea precipitațiilor, având efecte toxice asupra solului și vegetației, în special asupra pinului, legumelor, ghindei roșii și negre, frasinului alb, lucernei și murei. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor și erodarea monumentelor.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în județul Brașov în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.1.1:


Tabelul 1.1.2.1.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	4,9	12,1	6,9
2	Stația de traffic BV3 – B-dul Gării	7,9	19,7	14,5
3	Stația fond urban BV2 – Memorandului	5,2	9,8	8,4
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	6,6	10,6	10,5
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	5,5	13,7	8,1
6	Stația EM1 – Fundata	7,3	10,8	9,6

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.1.1 la stațiile de monitorizare:

- valorile medii orare înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și decât pragul de alertă pentru  $\text{SO}_2$  de  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- valorile medii zilnice înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

Evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentată în figura 1.1.2.1.1.

Figura 1.1.2.1.1. Evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  în luna decembrie

Concentrațiile medii zilnice de  $\text{SO}_2$  determinate sunt scăzute, mult mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția umană de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , variind într-un interval îngust.

### 1.1.2.2. Oxizii de azot

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. În stații se monitorizează monoxidul de azot ( $\text{NO}$ ), gaz incolor și inodor, dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ), gaz de culoare brun-roșcat cu miros puternic încărcat și  $\text{NO}_x$ .

Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din combustibili fosili.

În funcție de tipul lor, concentrația și perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte asupra sănătății umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Prin expunere la concentrații reduse de oxizi de azot este afectat țesutul pulmonar, iar la concentrații ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă produce dificultăți în respirație, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor și emfizem pulmonar prin distrugerea țesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectați de expunerea la oxizii de azot.

Expunerea vegetației la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau moartea țesuturilor vegetale și reducerea ritmului de creștere a acestora.

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitrărilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea țesuturilor, erodarea monumentelor, corodarea metalelor și decolorarea vopselelor.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în județul Brașov în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.2.1.:

Tabelul 1.1.2.2.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunată, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	32,6	3,5	90,2
2	Stația de traffic BV3 – B-dul Gării	33,1	3,9	82,1
3	Stația de fond urban BV2 – Memorandului	17,2	2,5	51,9
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	12,0	2,3	57,3
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	30,2	4,0	85,9
6	Stația EM1 – Fundata	9,5	LD	130,5

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.2.1, la stațiile de monitorizare amplasate în județul Brașov au fost respectate obiectivele de calitate pentru dioxidul de azot, valorile medii orare înregistrate fiind mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $200\mu\text{g}/\text{m}^3$  și mai mici decât pragul de alertă de  $400\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare este prezentată în figura 1.1.2.2.1.




Figura 1.1.2.2.1. Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  în luna decembrie

În graficul anterior se observă că cele mai mari concentrații au fost măsurate la stațiile amplasate în zone cu trafic intens. În luna decembrie au fost înregistrate concentrații mai mari de  $120\mu\text{g}/\text{m}^3$  în zona Fundata, corelat cu variația concentrației de  $\text{NO}_2$ , în aceeași perioadă fiind înregistrate creșteri ale concentrației de etilbenzen și xileni, în perioade cu condiții nefavorabile dispersiei poluanților (ceată, viteza vântului sub  $1\text{ m/s}$ , umiditate ridicată și chiciură persistentă).

Ciclul zilnic al  $\text{NO}_2$  și  $\text{NO}$  în baza datelor înregistrate și validate în luna decembrie de la stațiile de monitorizare din Brașov este prezentat în figura 1.1.2.2.2.




Figura 1.1.2.2.2. Ciclul zilnic al  $\text{NO}_2$  și  $\text{NO}$

Figura 1.1.2.2.2. prezintă evoluția concentrației de oxizi de azot în timpul zilei în funcție de variația fluxului traficului rutier și a condițiilor de dispersie. Valorile concentrației de  $\text{NO}$  prezintă un maxim în timpul dimineții, în intervalul orar în care traficul este mai intens și scade pe parcursul restului zilei. Se observă un pic similar în timpul serii datorat emisiilor echivalente și stabilității atmosferice care împiedică dispersia poluanților.

În urma proceselor de ardere a combustibililor se formează un amestec de  $\text{NO}$  și  $\text{NO}_2$ , în care aproximativ 90% este  $\text{NO}$ . Deși este emis direct de surse într-o proporție mică,  $\text{NO}_2$  se formează în atmosferă prin oxidarea  $\text{NO}$  produs la arderea combustibililor fosili cu  $\text{O}_3$  troposferic prezent în atmosferă. În aceste condiții în zonele urbane cu trafic intens concentrația oxizilor de azot este mai mare fiind favorizată prezența  $\text{NO}$ . În zona rurală, la Sânpetru și Fundata valorile concentrației de  $\text{NO}$  și  $\text{NO}_2$  sunt mai mici, stațiile fiind amplasate la distanță de surse care emit oxizi de azot.

În figura 1.1.2.2.3. este prezentat ciclul zilnic al oxizilor de azot pentru zilele lucrătoare din săptămână și pentru zilele de weekend în municipiul Brașov în baza datelor validate achiziționate la stațiile de monitorizare în luna decembrie.




Figura 1.1.2.2.3. Ciclul zilnic al oxizilor de azot în timpul săptămânii

În figura 1.1.2.2.3. se poate observa variația diurnă a concentrației de NO în funcție de variația fluxului de trafic și a condițiilor de dispersie. Datele indică un pic în intervalul 7 și 11 am, corespunzător orelor cu trafic intens în zilele lucrătoare din săptămână și unei stabilități atmosferice ridicate. În timpul serii, deși emisiile sunt echivalente se observă apariția unui pic mai mic datorată dispersiei poluanților, ca urmare a instabilității atmosferice. Concentrația de NO la stația de fond urban și în week-end este mai scăzută în comparație cu stațiile de trafic și zilele lucrătoare, în principal, datorită traficului redus, iar perioadele în care apar picuri coincid cu intervalul în care traficul este mai intens pentru activitățile de weekend.

Ciclul zilnic al NO<sub>2</sub> evidențiază un nivel de fond de NO<sub>2</sub> prezent în atmosferă și o creștere a concentrației pe timpul zilei, ca urmare a reacțiilor fotochimice și a prezenței NO în concentrații mai mari, în special în zilele lucrătoare. În week-end concentrația de NO<sub>2</sub> este mai mică, în principal datorită traficului rutier mai redus.

Concentrațiile cele mai mari de NO și NO<sub>2</sub> au fost înregistrate în zonele și în perioadele cu traficul cel mai intens.

La Sânpetru și Fundata valorile concentrației de NO și NO<sub>2</sub> sunt mai mici, stațiile fiind amplasate la distanță de surse care emit oxizi de azot.

Ciclul zilnic al NO și CO în baza datelor înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov, Sânpetru și Fundata este prezentat în figura 1.1.2.2.4.





Figura 1.1.2.2.4. Ciclul zilnic al NO și CO

Evoluția mediilor orare prezentate în figura 1.1.2.2.4. confirmă faptul că traficul rutier este o sursă importantă pentru prezența NO și CO în aerul ambiental din Brașov. Corelând variația concentrației celor doi poluanți specifici traficului rutier se observă că valorile concentrațiilor medii orare de NO și CO înregistrate în Brașov au același trend, cresc simultan pe același interval orar și prezintă un maxim în intervalul orar în care traficul este mai intens. Concentrația de NO și CO la Sânpetru și Fundata este mai mică, datorită traficului redus din zona stației.

În figura 1.1.2.2.5. este prezentat ciclul zilnic al CO și NO pentru zilele lucrătoare din săptămână și pentru zilele de weekend în baza datelor achiziționate la stațiile de monitorizare din Brașov în luna decembrie.






Figura 1.1.2.2.5. Ciclul zilnic al NO și CO în timpul săptămânii

În figura 1.1.2.2.5. se poate observa variația diurnă a concentrației de NO și CO în funcție de variația fluxului de trafic și a condițiilor de dispersie. În Brașov datele indică apariția unui pic de concentrație simultan pentru NO și CO dimineață, în perioada cu trafic intens și stabilitate atmosferică ridicată, ulterior o scădere a concentrației pe măsură ce intensitatea traficului rutier scade și apariția unui pic similar seara. În week-end concentrația celor doi poluanți este mai mică, în principal datorită traficului rutier mai redus, creșterile fiind cauzate de intensificarea traficului pentru activitățile de weekend.

La Sânpetru valorile concentrației de NO și CO sunt mai mici decât în Brașov, stația fiind amplasată la distanță de surse care emite NO și CO, seară se observă apariția unui pic mai mare la CO și NO, ca urmare a intensificării emisiilor provenite din diverse procese de ardere.

La Fundata valorile concentrației de NO și CO sunt mici, stația fiind amplasată la distanță de surse care emit NO și CO.

### 1.1.2.3. Ozonul

Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros încăios este concentrat în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vietii. În urma unor reacții fotochimice între oxizii de azot și compuși organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposferic. Alături de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.

Efectele ozonului asupra sănătății umane sunt diferite în funcție de concentrația ozonului troposferic prezent în aerul ambiental. Concentrațiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii. Prin acțiunea agresivă exercitată asupra vegetației, pădurilor și recoltelor, care poate ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari daune produse în sectorul agricol în Europa.


Rezultatele monitorizării O<sub>3</sub> la stațiile de monitorizare din Brașov în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.3.1.

Tabelul 1.1.2.3.1. Rezultatele monitorizării ozonului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandum	26,2	4,4	75,0
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	22,3	LD	100,1
3	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	18,4	LD	67,3
4	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	30,1	4,9	89,1
5	Stația fond urban BV6 – Codlea	33,9	3,0	75,2
6	Stația EM1 – Fundata	49,0	14,0	82,6

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.3.1 valorile mediilor orare înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov sunt mai mici decât pragul de informare de 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  și pragul de alertă de 240  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentată în figura 1.1.2.3.1.

Figura 1.1.2.3.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> în luna decembrie

În figura 1.1.2.3.1. se observă că în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov au fost înregistrate valori mai mici decât obiectivul pe termen lung și valoarea țintă pentru protecția sănătății umane de 120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai mare. Spre deosebire de alți poluanți, concentrațiile de ozon sunt în general, mai mari în zonele depărtate de sursele primare de emisie, pe direcția predominantă a vântului dinspre aceste zone. Acest lucru se doarează faptului că la distanțe scurte de sursele de NO<sub>x</sub>, așa cum este cazul la stațiilor de trafic, ozonul este consumat chimic de NO emis.

Figura 1.1.2.3.2. prezintă ciclul zilnic al O<sub>3</sub> pe baza datelor înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov, Codlea, Sânpetru și Fundata.





Figura 1.1.2.3.2. Ciclul zilnic al ozonului

Din figura anterioară se observă că formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai mare.

Figura 1.1.2.3.3. prezintă ciclul zilnic al  $O_3$  și  $NO_2$  pe baza datelor înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov.

Figura 1.1.2.3.3. Ciclul zilnic al  $O_3$  și  $NO_2$ 

Examinând figura anterioară se observă că în primele ore ale dimineții, din cauza traficului intens sunt emiși poluanți primari în concentrații mari, care reacționează cu  $O_3$  existent, determinând astfel o ușoară scădere a concentrației de ozon în atmosferă în zona urbană. Odată cu creșterea intensității radiației solare sunt accelerate reacțiile fotochimice determinând creșterea concentrației de  $NO_2$  în cursul dimineții în intervalul orar 7 – 11 în Brașov, creșterea concentrației și apariția picului de ozon la stația de fond urban și suburban, în intervalul orar 11 – 20, format prin reacțiile fotochimice ale  $NO_2$  cu compușii organici volatili – precuitori ai ozonului. De asemenea, se observă că în perioada în care  $O_3$  prezintă un maxim, concentrația de  $NO_2$  este minimă, ca urmare a consumării  $NO_2$  la formarea  $O_3$ . La stația EM 1 Fundata se observă că ozonul are o variație mică în timpul zilei, ca urmare a faptului că aportul de poluanți precuitori ai ozonului este minim, aproape inexistent, iar reacțiile fotochimice sunt aproape la echilibru.

#### 1.1.2.4. Pulberile în suspensie PM10 și PM2,5

Pulberile în suspensie sunt poluanți primari eliminați în atmosferă din surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului) sau surse antropice (activități

industriale, procese de combustie, traficul rutier) și poluanți secundari formati în urma reacțiilor chimice din atmosferă în care sunt implicați alți poluanți primari ca SO<sub>2</sub>, NOx și NH<sub>3</sub>.

Fracția PM10 a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm, iar fracția PM 2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 2,5 µm.


Rezultatele monitorizării prin metoda de referință gravimetrică și automată a pulberilor în suspensie fracția PM10 în județul Brașov în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.1.

Tabelul 1.1.2.4.1. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		Metoda automată	
		Valoarea medie lună, µg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei zilnice, µg/m <sup>3</sup>	Valoarea medie lună, µg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei zilnice, µg/m <sup>3</sup>
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	17,8	58,2	27,2	59,1
2	Stația de trafic BV3 – B – dul Gării	22,6	59,5	28,8	74,9
3	Stația de fond urban BV2 – Memorandului	16,6	50,7	20,3	74,6
4	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-	27,7	57,0
5	Stația de fond urban BV6 – Codlea	23,5	52,4	-	-
6	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	13,6	41,2	24,0	54,6
7	Stația EM1 – Fundata	2,5	7,7	13,5	30,0

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.4. în luna decembrie 2021 nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50 µg/m<sup>3</sup>, **cu excepția către unei valori la stația BV1, la stația BV2, la stația BV3 și la stația BV6.**

În figura 1.1.2.4.1. este prezentată evoluția mediilor zilnice de PM10 în luna decembrie în cele cinci stații de monitorizare din Brașov.







Figura 1.1.2.4.1. Evoluția mediilor zilnice de PM 10 în luna decembrie

Există mai multe surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, cum ar fi **arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor**, alte procese de combustie (arderi pentru încălzirea rezidențială, incinerarea deșeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea metalelor), **șantierele**, uzura carosabilului, uzura anvelopelor și corodarea părților metalice ale vehiculelor; dar trebuie avute în vedere și fenomele de transport a PM la distanță, **resuspensia particulelor**, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătății umane, în special asupra aparatului respirator, este influențat de dimensiunea și compoziția chimică a particulelor. Particulele mari sunt oprite în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritații ale căilor respiratorii, dar de unde pot fi eliminate. Particulele mai mici de 1  $\mu\text{m}$  ajung în alveolele pulmonare unde se depun și de unde pot trece în sânge, provocând inflamații și intoxicații, în funcție de compoziția chimică. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu pulperi accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți în respirație.

În graficul de mai jos este reprezentată evoluția concentrațiilor de PM10 în funcție de viteza vântului la stațiile BV2 Memorandului și BV3 B-dul Gării din Brașov, precum și BV6 Codlea și BV4 Sânpetru, pentru perioada în care au fost monitorizați simultan cei doi parametrii.






Figura 1.1.2.4.2. Evoluția mediilor zilnice de PM 10 în funcție de viteză vântului

Din graficul anterior se observă că **cele mai mari concentrații de PM10 se înregistrează în condițiile de calm atmosferic**, atunci când viteza vântului este mică. În luna decembrie viteza medie lunară a vântului a fost de 0,05 m/s la stația BV2, 0,23 m/s la stația BV3, 0,75 m/s la stația BV6 și 1,39 m/s la stația BV4. Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiții foarte slabe pentru dispersia PM10 și în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale dar și a celor transportate pe distanțe lungi.

Acste date sunt reprezentative pentru a exemplifica **vulnerabilitatea pe care factorii naturali (condițiile meteo și topografia) o conferă Brașovului pentru poluarea aerului cu pulberi în suspensie, fracția PM10**.

În figura 1.1.2.4.3 este prezentat ciclul zilnic al PM10 și CO calculat în baza datelor achiziționate la stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru în luna decembrie.




Figura 1.1.2.4.3: Ciclul zilnic al PM10 și CO în Brașov și Sânpetru

Urmărind evoluția similară a datelor prezentate în graficul anterior se poate concluziona că în luna decembrie traficul rutier a fost sursa relevantă pentru PM10 din aerul ambiental în Brașov. În timpul serii se observă apariția unui pic pentru concentrațiile de CO și PM10 la Sânpetru din

cauza intensificării emisiilor de CO și PM10 în zona de reprezentativitate a stației BV4 (procese de ardere combustibil solid).

Rezultatele monitorizării fracției PM 2,5 din pulberile în suspensie în stația de fond urban BV2 Memorandului, în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.2.

Tabelul 1.1.2.4.2. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM 2,5

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică	
		Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandului	13,5	41,2

Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2,5 și PM10 măsurate prin metoda gravimetrică de referință înregistrate în luna decembrie în stația de fond urban BV2 este prezentată în figura 1.1.2.4.4.




Figura 1.1.2.4.4 Evoluția mediilor zilnice de PM 2,5 și PM10 în luna decembrie

Din graficul anterior se observă că valorile concentrațiilor medii zilnice de PM2, 5 și PM10 înregistrate în Brașov (la stația BV2) au același trend, cresc simultan pe același interval de timp. Evoluția datelor din graficul anterior indică faptul că **particulele fine** (cu diametrul mai mic de 2,5 $\mu\text{m}$ ) **au fost, preponderent, componenta principală a pulberilor în suspensie** măsurate în luna decembrie în perioada cu temperaturi mai scăzute.

În graficul de mai jos este reprezentată evoluția concentratiilor de PM2,5 în funcție de viteza vântului la stația BV2 – Memorandului pentru perioada în care au fost monitorizați simultan cei doi parametrii.




Figura 1.1.2.4.5. Evoluția mediilor zilnice de PM 2,5 în funcție de viteza vântului

Din graficul anterior se observă că **cele mai mari concentrații de PM2,5 se înregistrează în condițiile de calm atmosferic**, atunci când viteza vântului este mică. În luna decembrie viteza

medie lunară a vântului a fost de 0,05 m/s la stația BV2. Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiții foarte slabe pentru dispersia PM<sub>2,5</sub> și în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale dar și a celor transportate pe distanțe lungi.

Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica **vulnerabilitatea pe care factorii naturali (condițiile meteo și topografia) o conferă Brașovului pentru poluarea aerului cu pulperi în suspensie, fracția PM<sub>2,5</sub>.**

#### 1.1.2.5. Monoxidul de carbon

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar și de la producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Efectele asupra sănătății populației depind de concentrația CO în aerul ambiental și de perioada de expunere. În concentrații mari (de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) este un gaz toxic, fiind letal prin reducerea capacitații de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afecteză sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică. Expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare și determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.

La concentrații monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon în județul Brașov în luna decembrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.5.1.

Tabelul 1.1.2.5.1. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei orare, mg/m <sup>3</sup>
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	0,68	1,36
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	0,87	1,68
3	Stația fond urban BV2 – Memorandumul	0,79	1,17
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	1,13	2,51
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	1,14	1,63
6	Stația EM1 – Fundata	0,76	0,79

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.5.1 valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore înregistrate la stațiile de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecția sănătății umane de 10 mg/m<sup>3</sup>.

În figura 1.1.2.5.1 este prezentată evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de CO obținute în baza datelor achiziționate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din județul Brașov.




Figura 1.1.2.5.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediei mobile de CO în luna decembrie

Din figura 1.1.2.5.1 se observă că în luna decembrie au fost înregistrate valori mai mici decât obiectivul de calitate a aerului ambiental pentru CO.

Ciclul zilnic al CO în baza datelor înregistrate în luna decembrie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentat în figura 1.1.2.5.2.




Figura 1.1.2.5.2. Ciclul zilnic al CO

În figura 1.1.2.5.2. se observă că evoluția concentrației CO prezintă un maxim în zonele și perioadele cu trafic intens, din cauza emisiilor provenite din arderea combustibililor în motoarele automobilelor.

În figura 1.1.2.5.3. este prezentat ciclul zilnic al CO pentru zilele lucrătoare din săptămână și pentru zilele de weekend în Brașov, Sânpetru și Fundata, în baza datelor achiziționate în luna decembrie.




Figura 1.1.2.5.3. Ciclul zilnic al CO în timpul săptămânii

În figura 1.1.2.5.3. se poate observa variația diurnă a concentrației de CO în funcție de variația fluxului de trafic și a condițiilor de dispersie. Datele indică apariția unui pic în intervalul 7 și 12 am, corespunzător orelor cu trafic intens și unei stabilități atmosferice ridicate. Ulterior se observă o scădere graduală, iar în timpul serii, deși emisiile sunt echivalente se observă apariția unui pic mai mic datorată dispersiei poluanților, ca urmare a instabilității atmosferice. La Sânpetru și Fundata valorile sunt mici, stațiile fiind amplasate la distanță de surse locale de emisii. În timpul

serii se observă apariția unui pic pentru concentrația de CO la Sânpetru din cauza intensificării emisiilor de CO în zona de reprezentativitate a stației BV4 (procese de ardere combustibil solid).

#### 1.1.2.6. Benzenul

Benzenul, primul termen în seria compușilor aromatici, este un compus organic insolubil în apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar și din evaporarea solventilor organici folosiți în diferite activități industriale și evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen.

Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp mare de permanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula.

Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental și a fumului de țigară sau ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de țigară conține benzen în concentrații ridicate și este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi și pasivi.

Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenul este reactant. În urma cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substăncelor cu efect cancerigen.

Rezultatele monitorizării benzenului în luna decembrie la stațiile de monitorizare din Brașov sunt prezentate în tabelul 1.1.2.6.1.

Tabelul 1.1.2.6.1. Rezultatele monitorizării benzenului

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Captura de date valide	Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	98,5 %	2,6	1,2	4,9
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	89,5 %	2,6	1,2	5,0
3	Stația fond urban BV2 – Memorandului	96,8 %	3,7	0,9	9,1
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	99,1%	2,4	0,9	4,2
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	96,9 %	2,6	1,0	4,8
6	Stația fond urban BV6 – Codlea	95,3 %	3,3	0,7	8,3
7	Stația EM1 – Fundata	97,7 %	1,2	0,2	1,1

În figura 1.1.2.6.1 este prezentată evoluția mediilor zilnice de benzen la stațiile de monitorizare din județul Brașov în luna decembrie și se observă că la stațiile din aglomerarea Brașov au fost înregistrate valori medii zilnice mai mari.




Figura 1.1.2.6.1: Evoluția mediilor zilnice de benzen în luna decembrie

În figura 1.1.2.6.2 este prezentat ciclul zilnic al CO și benzenului calculat în baza datelor achiziționate la stațiile de monitorizare din Brașov în luna decembrie.





Figura 1.1.2.6.2: Ciclul zilnic al CO și benzenului în Brașov

Urmărind evoluția similară a datelor prezentate în graficul anterior, se poate concluziona că în luna decembrie traficul rutier a fost sursa relevantă pentru benzenul din aerul ambiental în Brașov, fiind înregistrate valori ridicate în orele cu trafic intens, dar au fost și alte surse (activitățile de asfaltare și marcări rutiere) responsabile pentru prezența benzenului în aerul ambiental. La Sânpetru și la Fundata se observă un nivel mai scăzut, relativ constant de benzen în timpul zilei, conform datelor măsurate. În timpul serii se observă apariția unui pic pentru concentrațiile de CO și benzen la Sânpetru din cauza intensificării emisiilor de CO și benzen în zona de reprezentativitate a stației BV4 (procese de ardere combustibil solid).

#### 1.1.2.7. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului

În baza datelor achiziționate de la stațiile automate din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului și validate pentru luna decembrie a fost stabilit indicele general zilnic de calitatea aerului ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru **SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO și PM10**.

Evoluția indicelui general de calitatea aerului, exprimat prin indici de la 1 la 6, cu următoarea semnificație: 1 – bun, 2 – acceptabil, 3 – moderat, 4 – rău, 5 – foarte rău, 6 – extrem de rău, este prezentată în graficul următor:



**Notă:** Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit conform OM 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru fiecare indicator **SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, și PM10** în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora.

Din graficul anterior se observă că în luna **decembrie 2021 au fost zile în care calitatea aerului a fost rea**, indicele general zilnic de calitatea aerului fiind determinat de indicele specific al PM10 (pulberi în suspensie, fracția gravimetrică PM10) și la stația EM1 indicele specific al NO<sub>2</sub>.

În luna **decembrie** au fost înregistrate concentrații medii pe 24 ore de pulberi în suspensie fracția PM10, măsurate prin nefelometrie ortogonală, mai mari decât valoarea limită zilnică de **50µg/m<sup>3</sup>** în zona Calea București, Memorandului, B-dul Gării și B-dul Vlahuță din Brașov și Str. Morii din Sânpetru, corelat cu variația concentrației de PM10, în această perioadă au fost înregistrate creșteri ale concentrației de NO<sub>2</sub> și CO fără a se depăși valorile limită reglementate pentru acești indicatori, fiind observate și creșteri ale concentrației de benzen. De asemenea, au fost înregistrate concentrații medii orare de dioxid de azot, NO<sub>2</sub>, mai mari decât valoarea de **120µg/m<sup>3</sup>** în zona Fundata, corelat cu variația concentrației de NO<sub>2</sub>, în aceeași perioadă fiind înregistrate creșteri ale concentrației de etilbenzen și xileni.

Valorile ridicate pentru concentrația de pulberi în suspensie fracția PM10 și NO<sub>2</sub> în aceste zone au fost cauzate de emisiile provenite din traficul rutier și alte procese de ardere, asociate cu **condițiile nefavorabile dispersiei poluanților** (inversiune termică, ceată, viteza vântului sub 1 m/s și umiditate ridicată, dar și chiciură persistentă la EM1).

S-a observat că nu au mai fost înregistrate valori crescute pentru concentrația de PM10 și NO<sub>2</sub>, fiind înregistrată scăderea concentrațiilor la valorile obișnuite, de îndată ce condițiile meteorologice au determinat dispersia poluanților în aerul ambiental sau ca urmare a căderilor de precipitații.

#### **1.1.2.8. Concluzii legate de calitatea aerului ambiental în aglomerarea Brașov**

1. Stațiile de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Brașov sunt instrumente în gestionarea calității aerului ambiental, furnizând datele referitoare la evaluarea calității aerului efectuată prin măsurători în puncte fixe.
2. În baza **datelor achiziționate și validate** pentru luna **decembrie 2021** nivelul poluării din zona monitorizată a fost scăzut, fiind înregistrată:
  - a. încadrarea tuturor valorilor medii orare sub pragurile de alertă pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și ozon și respectiv sub pragul de informare pentru ozon;
  - b. încadrarea tuturor valorilor medii orare pentru dioxid de sulf, pentru dioxid de azot, a mediilor zilnice pentru PM10, **cu excepția câte unei valori la stația BV1, la stația BV2, la stația BV3 și la stația BV6**, a mediilor zilnice de dioxid de sulf și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore pentru CO sub valorile limită și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> sub valoarea țintă.
3. Valorile ridicate pentru concentrația de pulberi în suspensie fracția PM10 au fost **cauzate de emisiile provenite din traficul rutier și alte procese de ardere, asociate cu condițiile nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic, inversiune termică, ceată și/sau umiditate ridicată)**, în aceeași perioadă fiind înregistrate creșteri ale concentrației de NO<sub>2</sub> și CO fără a se depăși valorile limită reglementate pentru acești indicatori, dar și creșteri ale concentrației de benzen.
4. În zona municipiului Brașov o sursă importantă de poluare și implicit de diminuare a calității aerului este traficul rutier, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de concentrație pentru poluanții specifici monitorizați – CO, NO, NO<sub>2</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> și PM10.
5. La stația EM1 în zona Fundata au fost înregistrate concentrații medii orare de dioxid de azot, NO<sub>2</sub>, mai mari decât valoarea de **120µg/m<sup>3</sup>**, corelat cu variația concentrației de NO<sub>2</sub>, în aceeași perioadă fiind înregistrate creșteri ale concentrației de etilbenzen și xileni în perioade cu condiții nefavorabile dispersiei poluanților (ceată, viteza vântului sub 1 m/s, umiditate ridicată și chiciură persistentă).
6. În zonele situate în Sânpetru, Codlea și Fundata aerul ambiental a avut o calitate mai bună în raport cu concentrațiile poluanților primari, fiind înregistrate concentrații mai mari de ozon troposferic, ca urmare a manifestării condițiilor prielnice formării ozonului troposferic (intensitatea radiației solare ridicată, calm atmosferic, temperatura ambientală peste 20°C și prezența precursorilor ozon – NOx, COV, CO).
7. Probele de precipitații prelevate în luna luna decembrie 2021 au avut pH neutru, cu excepția a 2 probe care au avut pH peste 6 upH, cauzat de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabii, în probele prelevate.

**Întocmit:** Marcela Miloșan și Ioana Benga

## 1.2. Radioactivitatea mediului

Componentă a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), Stația de Radioactivitate Brașov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune măsurători ale activității  $\beta$  globale în raport cu sursa etalon ( $\text{Sr-Y}^{90}$ ) asupra factorilor de mediu: aer, depunerি atmosferice, ape brute de suprafață și de adîncime, sol necultivat și vegetație spontană (aprilie-octombrie), precum și măsurători ale debitului de doză gamma.

Avantajul măsurătorilor  $\beta$  globale: eficacitatea de detecție  $\beta$  este mult mai mare, deci volumul probelor colectate poate fi mai mic și implicit timpul necesar obținerii valorilor radioactivității va fi mai mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenti, probele prelucrate se trimit lunar spre analiză spectrometrică la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM București.

Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultatele măsurărilor  $\beta$  globale. După validare, acestea sunt preluate în circuit internațional.

**Radioactivitatea naturală a mediului** este sursa majoră de iradiere (internă și externă) a organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezența în aer, apă, sol, vegetație, organisme animale a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural din cele mai vechi timpuri, la care se adaugă radiația cosmică.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenții gazelor radioactive Radon și Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 și respectiv Th-232, aflate în scoarța terestră în cantități mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de dezintegrare radioactivă, descendenții de viață scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în aer: o parte rămân în galerii, peșteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol își ieșe rapid la suprafața terestră. În momentul formării, acești descendenți sunt ionizați pozitiv și pot forma complexe care se pot ataşa de particulele de praf și aerosoli.

Toronul, având un timp de înjumătățire foarte mic, se dezintegreză foarte repede, deci în mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol, provenit el însuși din seriile uraniului și toriului.

**Radioactivitatea aerului** se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se efectuează două aspirații pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuției radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare, la 20 de ore și la 5 zile).

Pe baza valorilor obținute, se calculează și activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai răspândiți în atmosferă: **Radon (Rn-222)** cu timp de înjumătățire de 3,82 zile și **Toron (Rn-220)** cu timp de înjumătățire de 55,6 secunde.

Valorile activității sunt supuse unor fluctuații puternice, în spațiu și timp, ca urmare a condițiilor locale și a influenței factorilor meteorologici. Astfel, în primul rand, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă și de tipul și starea solului (afânat, cu capilarele îmbibate cu apă, acoperit cu zăpadă, etc). Variația medie a acestor condiții determină o variație anotimpuală a radioactivității aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara.

În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenați în procesul de difuzie, puternic influențat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variație diurnă a concentrației radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineață, la răsăritul soarelui, provenit din apariția inversiunii de temperatură, care face ca radionuclizii să se acumuleze în stratul de lângă sol, fiind împiedicați să se împrăștie pe verticală. Maximul de dimineață se manifestă și mai pregnant în prezența ceții, sau a oricăror factori atmosferici care favorizează condiții slabe de dispersie în atmosferă.

Monitorizarea permanentă a radioactivității mediului conduce la cunoașterea acestor variații și permite distincția între creșteri ale radioactivității datorate fluctuațiilor naturale sau creșteri ale radioactivității rezultate din eventuale accidente.

În luna decembrie 2021 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mici decât cele din luna noiembrie atât la aspirația de noapte (interval orar 2-7) cât și la cea diurnă (interval orar 8-13).




Fig. 1.2.1. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

În consecință, valorile concentrațiilor radioizotopilor naturali Radon și Toron sunt la fel, mai mici, atât la aspirația de noapte (interval orar 2-7) cât și la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna noiembrie.




Fig. 1.2.2. Activitatea calculată a Radonului

**Debitul dozei gamma în aer.** Datele se preiau de la Stația automată situată în apropierea sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză la interval orar. În luna decembrie, valorile orare s-au încadrat între 0.071 și 0.158 µSv/h, cu o medie lunară de 0.103 µSv/h.




Fig. 1.2.3. Debitul dozei gamma în aer

**Depunerile atmosferice.** Probele se preleveză zilnic pe o suprafață de 0.3 m<sup>2</sup>, durata de prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării și din nou după 5 zile, pentru detectarea radionuclizilor artificiali.

În luna decembrie media valorilor activității imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mică decât media lunii anterioare și mai mare la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitații colectat a fost în luna decembrie de 20.450 litri față de 10.990 litri în luna noiembrie.




Fig. 1.2.4. Activitatea beta globală pentru depunerile atmosferice

#### Radioactivitatea apelor.

Probele de apă recoltate din județ se supun procesului de evaporare lentă și se măsoară radioactivitatea beta globală a reziduului rezultat, imediat și după 5 zile pentru a elimina contribuția radionuclizilor naturali, cu timp de viață scurtă.

**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Ghimbășel** la Ghimbav se prelveează zilnic. Media lunii decembrie a activității beta globale măsurate este mai mică decât valoarea din luna noiembrie. Cele mai multe valori zilnice ale activității beta globale măsurate se mențin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecție a aparaturii.




Fig. 1.2.5. Activitatea beta globală imediată pentru apa de suprafață Pârâul Ghimbășel

**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Rotbășel** - la Rotbav se prelveează lunar. Valoarea activității beta globale măsurată în luna decembrie este mai mare decât valoarea lunii noiembrie și comparabilă cu cele din lunile anterioare.




Fig. 1.2.6. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață-Pârâul Rotbășel

Apa de suprafață din **Râul Olt** se prelevează lunar în mai multe puncte de pe traseul acestuia prin județul Brașov. În luna decembrie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș. Valorile activității beta globale măsurate sunt apropiate de valorile din luna precedentă și comparabile cu cele din lunile anterioare.




Fig. 1.2.7. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață Râul Olt

**Proba de apă brută de adâncime** se prelevează lunar dintr-o fântână particulară la Rotbav. Valoarea activității beta globală a probei măsurate în luna octombrie este apropiată de media multianuală, aflându-se sub nivelul de notificare stabilit.

**Solul necultivat.** Solul se prelevează săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui Tâmpa, în apropierea sediului APM Brașov. În luna decembrie valoarea medie a activității este mai mare decât media lunii septembrie și mai mare decât cea multianuală.




Fig. 1.2.8. Activitatea beta globală la 5 zile pentru solul necultivat

**Vegetația spontană.** Se recoltează între 01 aprilie și 31 octombrie din aceeași zonă ca și solul necultivat.

Rezultatele măsurătorilor beta globale efectuate în programul standard sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 1.2.1: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare

<b>STATIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM STANDARD</b>					
<b>Luna decembrie, anul 2021</b>					
<b>Aerosoli atmosferici</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.semif.</b>
<b>Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc</b>					
aspiratia 2-7	0.39	1.94	4.16	24.12.2021	31
aspiratia 8-13	0.20	1.84	3.55	10.12.2021	31
<b>Valori după 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc</b>					

**Radon, mBq/mc**

aspiratia 2-7	990.4	5651.11	12272.2	24.12.2021	31
aspiratia 8-13	423.9	5512.15	10747.6	10.12.2021	31

**Toron, mBq/mc**

aspiratia 2-7	24.3	103.19	372.3	02.12.2021	31
aspiratia 8-13	21.9	76.61	212.0	06.12.2021	31

**Depunerি atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp<sup>2</sup>·zi**

	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	0.75	<1.48	10.74	07.12.2021	19
Valori după 5 zile	0.6	0.89	1.8	07.12.2021	13

**Apa brută de suprafață – Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup>**

Locul prelevării: GHIMBAV, Pârâu Ghimbăsel; frecvența de prelevare: zilnic

	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	<238.6	251.98	262.1	14.12.2021	5
Valori după 5 zile	-	157.0	-	-	1

**Debitul dozei gama în aer,**

	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
microSv/h	0.071	0.103	0.158	07.12.2021	-

**Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg**

Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAȘOV; frecvența de prelevare: săptămânal

	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori după 5 zile	549.0	559.5	570.8	03.12.2021	3

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se urmăresc lunar apele de suprafață și freatică din zona **Feldioara - Rotbav**. În luna decembrie s-au prelevat probe din Olt la Feldioara, Măieruș și Făgăraș, Pârâul Rotbăsel și apă din pânza freatică - fântână din localitatea Rotbav.

Tabel 1.2.2: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

**STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV PROGRAM SPECIAL****Luna decembrie, anul 2021****Apă brută – Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup> (probe lunare)**

Data prelevării	17.12.2021	17.12.2021	28.12.2021	17.12.2021	17.12.2021
Tip de probă			Apă de suprafață		Apă freatică
Loc prelevare	Feldioara	Măieruș	Râul OLT	P. Rotbăsel	Fântâna
Valori +5 zile	218.4	249.6	169.5	Rotbav	Rotbav

**2. Deșeuri***Întocmit: Dorin Pruteanu*

În luna **decembrie** 2021 cantitățile de deșeuri generate de agenții economici aflați în evidență APM Brașov sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Denumire deșeu	Total cantitate (tone)	Agent economic
Lemn	1650,552	KRONOSPAN ROMANIA; INA SCHAEFFLER ROMANIA SRL; HUTCHINSON; QUIN ROMANIA SRL; LOSAN ROMANIA SRL
Metalice feroase	3341,74	INA SCHAEFFLER ROMANIA SRL; IUS, STABILUS; SC PREMIUM AEROTEC SRL; DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL; RUMAGOL SRL; DEFI GROUP ROMANIA SRL; HUTCHINSON SRL
Metalice neferoase	274,534	ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL; PREMIUM AEROTEC SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA; ISOPLUS SPECIAL SRL;

Textile	98,786	ROULEAU GUICHARD ROUMANIE; TEXTILE BLUE WASH SRL; AMANN ROMANIA; HARD GYM SRL; CURZONIA SRL
Hârtie și carton	1024,257	SELGROS, ALTIUS, LIDL DISCOUNT SRL; STABILUS; ECOPAPER; ECOPACK; EDS ROMANIA SRL; SC ARABESQUE SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA; QUIN ROMANIA SRL
Ulei uzat	10,358	SC SILNEF MG SRL; TIRIAC AUTO SRL; SC MARCOS AUTO DETAILING; RENACIA SRL; SC DIP MOTORS SRL; SC DUVENBECK LOGISTIK SRL; SC AUTOKOV SRL
Ulei alimentar	5,179	DORIPESCO PROD, ADRIAN RESTAURANTE SRL, POIANA RASNOAVEI SRL; SC AUCHAN ROMANIA SRL
Sticlă	55,27	URSUS BREWERIES SA; ALTIUS SRL, LUSTIC INVEST SRL; SC SERGIANA PRODIMPEX SRL
Mat. plastic	559,374	STAR EAST PET SRL; SC LIDL SRL; ARTIMA SA; SC LEFRUMARIN SRL; SERGIANA PRODIMPEX SRL; SC SELGROS SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA
Cauciuc	89,495	SC SILNEF MG SRL; SC FENEC RUBBER EASTERN SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA SC AUTOKOV SRL
Zgură și cenușă	159,724	KRONOSPAN; INA SCHAEFFLER ROMANIA SRL
Nămol industrial	3693,686	AMANN ROMANIA SRL; ECOPACK SRL, KRONOSPAN ROMANIA SRL; STABILUS ROMANIA SRL ; URUS BREWERIES SA
Nămol st. epurare orășenesti	1002,4	MORANI IMPEX, STATIA DE EPURARE Comp.Apa Brasov
Acumulatori uzați	2,841	SPRINTER 2000; SERBAN SRL; SILNEF MG
Dejecții animaliere	1516,70	AVICOLA BUCURESTI; LUCA SRL; SERGIANA PRODIMPEX SRL; AVICOLA BRASOV; LEFRUMARIN SRL; SC H&E REINERT SRL; SC TAVERNA SASULUI SRL;
Deșeuri periculoase	617,367	SC KRONOSPAN ROMANIA SRL; STABILUS ROMANIA SRL; SC QUIN ROMANIA SRL; SC EDS ROMANIA SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA
DEEE-uri	14,143	SC BRICOSTORE ROMANIA; SC BAUMAX ROMANIA SRL
Deșeuri spitalicești	81,5187	SC STERICYCLE ROMANIA SRL, AKSD Romania Tg.Mures

*Întocmit: Biroul CFM*

Având în vedere cele menționate anterior, se poate concluziona că activitățile antropice desfășurate în domeniile agricultură, industrie, energie și transport exercită presiuni asupra mediului, dar un impact semnificativ au industria și transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare în aceste domenii trebuie fundamentate pe principiul dezvoltării durabile, să ia în considerare potențialele efecte asupra mediului înconjurător, prin includerea protecției mediului în politicile sectoriale. Atingerea acestui obiectiv presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate și respectarea unor principii importante, precum: „poluatorul plătește”, „răspunderea poluatorului pentru paguba produsă”, combaterea poluării la sursă și împărțirea responsabilităților între operatorii economici și actorii locali – la nivel local, regional și național.

Director Executiv,

Ciprian BĂNCILĂ



Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare:  
Ioana -Cristina BENGA